Приложение 15
УТВЕРЖДЕНО
приказ УЗ "БОКВД"
от 02.03.2026 № 56 -А

ПРЕЙСКУРАНТ
**на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике**
оказываемые гражданам РБ, иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории РБ
учреждением здравоохранения "Брестский областной кожно-венерологический диспансер"

с02.03.2026
тип пациентаГражданин РБ

| № п/п | Наименование | Тариф | НДС по тарифу | Материлы | | | | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Итого | в т. ч | | | |
| | | | | | НДС | НДС 10 | НДС 20 | |
| **5** | **500. Бактериологические исследования** | | | | | | | |
| 525 | Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале (с забором материала в лаборатории) | 3.19 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| 526 | Обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале (с забором материала в лаборатории) | 3.19 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |
| 527 | Микроскопия препаратов нативного материала на дерматофиты и дрожжеподобные грибы | 2.43 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |
| 528 | Культуральное исследование слизистых на дерматофиты и дрожжеподобные грибы | 5.58 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 8.34 |
| 529 | Культуральное исследование кожи, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы | 5.58 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 8.62 |
| 530 | Определение гонореи методом ПЦР (РТ) (1 исследование) | 5.77 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 12.75 |
| 531 | Определение трихомоноза методом ПЦР (РТ) (1 исследование) | 5.77 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 11.33 |
| 532 | Определение уреаплазмоза (U urealiticum, парвум) методом ПЦР (РТ) (1 исследование) | 5.77 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 11.33 |
| 533 | Определение микоплазмоза (M hominis) методом ПЦР (РТ) (1 исследование) | 5.77 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 12.20 |
| 534 | Определение микоплазмоза (M genitalium) методом ПЦР (РТ) (1 исследование) | 5.77 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 11.32 |
| 535 | Определение хламидиоза методом ПЦР (РТ) (1 исследование) | 5.77 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 11.33 |
| 536 | Определение герпетической инфекции (ВПГ тип1,2) методом ПЦР (РТ) (1 исследование) | 5.77 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 12.01 |
| 537 | Определение цитомегаловирусной инфекции методом ПЦР (РТ) (1 исследование) | 5.77 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 10.29 |
| 538 | Определение папилломавирусной инфекции методом ПЦР (ВПЧ-тип.16,18) (1 исследование) | 5.77 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 12.27 |
| 539 | Определение гонореи методом ПЦР (РТ) (моча,сперма) | 5.77 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 12.75 |
| 540 | Определение трихомоноза методом ПЦР (РТ) (моча,сперма) | 5.77 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 11.33 |
| 541 | Определение уреаплазмоза (U urealiticum) методом ПЦР (РТ) | 5.77 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 11.33 |
| 542 | Определение микоплазмоза (M hominis) методом ПЦР (РТ) (моча,сперма) | 5.77 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 12.20 |
| 543 | Определение микоплазмоза (M genitalium) методом ПЦР (РТ) (моча,сперма) | 5.77 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 11.32 |
| 544 | Определение хламидиоза методом ПЦР (РТ) (моча,сперма) | 5.77 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 11.33 |
| 545 | Определение герпетической инфекции методом ПЦР (РТ) (моча,сперма) | 5.77 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 12.01 |
| 546 | Определение цитомегаловирусной инфекции методом ПЦР (РТ) (моча,сперма) | 5.77 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 10.29 |
| 547 | Определение папилломавирусной инфекции методом ПЦР (РТ-тип.16,18) (моча,сперма) | 5.77 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 12.27 |
| **6** | **600. Клинико-диагностические исследования** | | | | | | | |
| 626 | Лабораторное исследование на антиген к COVID - 19 методом иммунохроматографии (качественное определение) | 4.21 | 0 | 13.59 | 0.05 | 0.05 | 0 | 17.80 |
| 613 | РАЛ - реакция аггломерации лейкоцитов с капиллярной кровью (с одним медпрепаратом) | 4.32 | 0 | 3.36 | 0.09 | 0.09 | 0 | 7.68 |
| 614 | Риноцитограмма (микроскопическое исследование отделяемого полости носа) | 11.35 | 0 | 2.56 | 0.15 | 0.15 | 0 | 13.91 |
| 615 | Офтольмоцитограмма (микроскопическое исследование слизистой глаз) | 12.34 | 0 | 2.65 | 0.15 | 0.15 | 0 | 14.99 |
| 616 | Копрограмма (исследование кала) | 8.19 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 17.61 |
| 617 | Исследование кала на яйца гельминтов методом Като | 2.77 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
| 618 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3-х препаратах) | 2.77 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
| 619 | Определение 2-х возбудителей (лямблий и криптоспоридий) в кале | 2.04 | 0 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 31.11 |
| 620 | Общий анализ мочи | 2.25 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 6.19 |
| 621 | Общий анализ крови с забором и ланцетом | 6.32 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 9.83 |
| 622 | Общий анализ крови без забора | 5.7 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
| 623 | Подсчет LE-клеток | 10.47 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 11.35 |
| 624 | Определение глюкозы в цельной крови экспресс-методом | 1.94 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| 625 | Микроскопическое исследование соскоба со слизистой оболочки мочеполовых органов для обнаружения бледной трепонемы | 3.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 3.30 |
| **7** | **700. Серология** | | | | | | | |
| 716 | Сифилис ИФА - определение антител на сифилис методом ИФА | 4.16 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 8.32 |
| 717 | Сифилис РПР - Реакция быстрых плазменных реагинов на сифилис методом РПР | 9.72 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 11.65 |
| 719 | Определение иммуноглобулинов класса IgG+IgA на хламидиоз методом ИФА | 6.7 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 17.02 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | Определение аутоантител к различным антигенам методом иммуноблотинга-АНА профиль 3 | 16.63 | 0 | 54.64 | 0 | 0 | 0 | 71.27 |
| 718 | Сифилис РИФ (200+abs) качественный метод | 11.38 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 18.47 |
| 720 | Определение общего иммуноглобулина IgE | 4.16 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 10.97 |
| 721 | Определение специфических антител к аллергенам методом иммуноблотинга - панель 2 | 4.31 | 0 | 84.07 | 0 | 0 | 0 | 88.38 |
| 722 | Определение специфических антител к аллергенам методом иммуноблотинга - панель 3 | 4.31 | 0 | 84.53 | 0 | 0 | 0 | 88.84 |
| 723 | Определение специфических антител к аллергенам методом иммуноблотинга - панель 4 | 4.31 | 0 | 84.53 | 0 | 0 | 0 | 88.84 |
| 724 | Определение антител к антигенам лямблий методом ИФА | 4.16 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 13.80 |
| 725 | Определение антител к антигенам токсокар методом ИФА | 4.16 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 13.55 |
| 726 | Определение антител к антигенам токсокар, определение титра методом ИФА | 4.16 | 0 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 27.49 |
| 727 | Определение антител к антигенам аскарид методом ИФА | 4.16 | 0 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 15.97 |
| 729 | Определение аутоантител к циклическому цитрулиновому пептиду -anti-CCP методом ИФА | 4.16 | 0 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 19.05 |
| 730 | Определение антител к антигену CagA Helicobakter pulori методом ИФА | 4.16 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 14.17 |
| **8** | **800. Прочие исследования** | | | | | | | |
| 2.804 | Цитологическое исследование | 12.33 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0 | 12.41 |
| 2.805 | Жидкостная цитология | 43.36 | 0 | 17.77 | 1.61 | 1.61 | 0 | 61.13 |
| 2.801 | Микробиологические методы исследования отделяемого половых органов (уретра+цервикальный канал). Микрофолора и чувствительность к антибиотикам-женщины | 107.78 | 0 | 6.3 | 0.56 | 0.56 | 0 | 114.08 |
| 2.802 | Микробиологические методы исследования отделяемого половых (влагалище). Микрофолора и чувствительность к антибиотикам - женщины | 53.89 | 0 | 2.91 | 0.04 | 0.04 | 0 | 56.80 |
| 2.803 | Микробиологические методы исследования отделяемого половых (уретра). Микрофолора и чувствительность к антибиотикам - женщины | 53.89 | 0 | 3.15 | 0.28 | 0.28 | 0 | 57.04 |
| 2.806 | Бактериологический посев на дрожжеподобные грибы Candida, чувствительность к АМ (уроген. тракт) - женщины | 29.14 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 31.67 |
| 2.807 | Жидкостная цитология (ОНКО). | 8.05 | 0 | 0.87 | 0.07 | 0.07 | 0 | 8.92 |
| 3.801 | Микробиологические методы исследования отделяемого половых (уретра). Микрофолора и чувствительность к антибиотикам. - мужчины | 51.92 | 0 | 2.85 | 0.03 | 0.03 | 0 | 54.77 |
| 3.802 | Микробиологические методы исследования отделяемого половых органов (секрет предстательной железы). Микрофолора и чувствительность к антибиотикам. | 56.6 | 0 | 2.54 | 0.01 | 0.01 | 0 | 59.14 |
| 3.803 | Бактериологический посев на дрожжеподобные грибы Candida, чувствительность к АМ (уроген. тракт) - мужчины | 28.37 | 0 | 2.51 | 0.01 | 0.01 | 0 | 30.88 |
| 4.801 | Микробиологические методы исследования (пустулы). Микрофолора и чувствительность к антибиотикам. | 55.42 | 0 | 5.07 | 0.24 | 0.24 | 0 | 60.49 |
| 4.802 | Микробио. иссл.отделяемого дыхательных путей (зев, нос, носоглотка). Микрофолора и чувствительность к антибиотикам. | 52.08 | 0 | 3.2 | 0.08 | 0.08 | 0 | 55.28 |
| 4.803 | Микробио. иссл.отделяемого органов чувств (ухо, глаз) . Микрофолора и чувствительность к антибиотикам. | 50.92 | 0 | 2.72 | 0.03 | 0.03 | 0 | 53.64 |
| 4.804 | ОБ - Определение концентрации иммуноглобулинов (IgG+IgA+IgM) | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |
| **9** | **900. Процедурный кабинет** | | | | | | | |
| 914 | Взятие крови из пальца для определения спорного родства | 0.26 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 908 | Забор крови из вены (вакуумная система) | 0.83 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 2.92 |
| 909 | Забор крови из вены (плазмолифтинг с центрифугированием) вакуумная система | 1.77 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 8.06 |
| 910 | Забор крови из вены (Medical Case Plasmoactive стандарт с центрифугированием) | 1.3 | 0 | 32.52 | 0 | 0 | 0 | 33.82 |
| 911 | Забор крови из вены у детей (вакуумная система) | 0.83 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |
| 912 | Взятие крови из пальца ланцетом для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" (ОАК) | 0.62 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 2.68 |
| 913 | Взятие крови из пальца ланцетом для исследования одного показателя (РАЛ, глюкоза и др.) | 0.26 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |