

## ИППП (инфекции, передаваемые половым путем) вызываются:

- ◆ бактериями (сифилис, гонорея, хламидиоз, уреаплазмоз, бактериальный вагиноз)
- ◆ вирусами (СПИД, герпес генитальный, гепатит В, С, генитальные бородавки)
- ◆ простейшими (трихомониаз)
- ◆ дрожжеподобными грибками (кандидоз)
- ◆ паразитами и насекомыми (лобковый педикулез, чесотка).

**Трихомониаз** является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний мочеполовой системы.

## Как происходит заражение?

**Возбудителями инфекции** являются трихомонады, которые живут и размножаются в половых путях как мужчин, так и женщин и передаются преимущественно половым путем. Естественно, чаще всего заражение

происходит в результате случайных половых связей, во время незащищенного полового контакта.



**ОПРОВЕРГАЕМ СЛУХИ:** возможность инфицирования женщин трихомониазом при купании в реках, плавательных бассейнах, при посещении бань сегодня полностью исключается.

**С момента заражения** трихомониазом до появления первых признаков заболевания проходит от 4 до 15 дней.

## Симптомы заболевания

**У женщин** трихомонады вызывают воспаление слизистой влагалища. В большинстве случаев заболевание начинается остро: появляются обильные жидкие выделения, бели. Порой они бывают пенистыми, имеют примесь сукровичного секрета с неприятным запахом. Женщину беспокоит жжение, зуд. При воспалении слизистой оболочки мочеиспускательного канала (трихомонадном колпите) интимная близость причиняет боль. Нередко к колпиту присоединяется воспаление мочевого пузыря, сопровождающееся частыми болезненными позывами к мочеиспусканию.

**У мужчин** при трихомониазе воспаляется слизистая оболочка мочеиспускательного канала, возникает так называемый трихомонадный уретрит. При этом нередко поражаются и придаточные половые железы. Инфекция начинается остро, характеризуется часто обильными, иногда пенистыми выделениями из мочеиспускательного канала, края которого воспаляются и отекают. Однако в большинстве случаев трихомонадный уретрит у мужчин протекает вяло, без перечисленных симптомов.

## ВНИМАНИЕ!

Проявления трихомониаза как у мужчин, так и у женщин могут исчезнуть сами по себе, но это не значит, что наступило самоизлечение.

*Если не обращаться к врачу за помощью, то трихомониаз, периодически обостряясь, может продолжаться годами и даже десятилетиями. Носители трихомона, не подозревая о болезни, могут заражать здоровых людей.*

*Иногда трихомониаз напоминает другие болезни, передаваемые половым путем, - гонорею, хламидиоз, уреаплазмоз ... Определить заболевание в каждом конкретном случае можно только лабораторным путем.*

*Брожденной устойчивости к инфекции нет.*



## Трихомониаз опасен последствиями

Инфекция излечима при условии, если своевременно поставлен диагноз и правильно проводится лечение, в противном случае она опасна осложнениями.

Тяжелыми последствиями, в том числе бесплодием, трихомониаз грозит и мужчине, и женщине. Дело в том, что из мочеиспускательного канала трихомонады проникают в придатки яичек и предстательную железу, вызывая в тканях этих органов воспалительные процессы и нарушая тем самым их функции.

## ЗНАЙТЕ!

*От трихомониаза не существует домашних и народных средств. Лечитесь только в специализированном медицинском учреждении!*

Для предотвращения повторного заражения **ЛЕЧЕНИЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО МУЖУ И ЖЕНЕ, ИЛИ ОБОИМ ПОЛОВЫМ ПАРТНЕРАМ**, даже в том случае, если у мужчины трихомонады не обнаружены, а у женщины они есть, или, наоборот.

## Как защититься?

**УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ ИППЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ТРИХОМОНИАЗА, ВАМ ПОМОГУТ:**

- верность в браке или одному сексуальному партнеру;
- использование средств индивидуальной защиты, в первую очередь, презерватива и растворов хлоргексидина или мирамистина;
- забота о своем здоровье и здоровье своего партнера (осмотры у гинеколога, уролога, дерматовенеролога).



ИППЛ

Если Вам не удалось избежать случайной половой связи, обязательно подстрахуйтесь: **не позже 2-х часов после сомнительного контакта** обратитесь в пункт индивидуальной профилактики, где Вам бесплатно окажут анонимную квалифицированную медицинскую помощь.

**Тел. в г. Бресте: 8 (0162) 97-70-23**  
(круглосуточно)

**Возникли вопросы по проблеме? Обращайтесь!**

**Тел. в г. Бресте:  
8 (0162) 41-31-87**



Санитарно-эпидемиологическая служба МЗ РБ

ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер»

г. Брест, Лиц. № 02330/0131850 от 31.07.2006г. Зак. 1/9, тир. 200 экз., 2011г.

Трихомониаз