

ИППП (инфекции, передаваемые половым путем) вызываются:

- ◆ бактериями (сифилис, гонорея, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз)
- ◆ вирусами (ВИЧ, герпес генитальный, гепатит В, С, генитальные бородавки)
- ◆ простейшими (трихомониаз)
- ◆ дрожжеподобными грибами (урогенитальный кандидоз)
- ◆ паразитами и насекомыми (лобковый педикулез, чесотка).

Трихомониаз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний мочеполовой системы.

Как происходит заражение?

Возбудителями инфекции являются трихомонады, которые живут и размножаются в половых путях как мужчин, так и женщин и передаются преимущественно половым путем. Естественно, чаще всего заражение

происходит в результате случайных половых связей, во время незащищенного полового контакта.



ОПРОВЕРГАЕМ СЛУХИ: возможность инфицирования женщин трихомониазом при купании в реках, плавательных бассейнах, при посещении бань сегодня полностью исключается.

С момента заражения трихомониазом до появления первых признаков заболевания проходит от 4 до 15 дней.

Симптомы заболевания

У женщин трихомонады вызывают воспаление слизистой влагалища. В большинстве случаев заболевание начинается остро: появляются обильные жидкие выделения, бели. Порой они бывают пенстыми, имеют примесь сукровичного секрета с неприятным запахом. Женщину беспокоит жжение, зуд. При воспалении слизистой оболочки мочеиспускательного канала (трихомонадном кольпите) интимная близость причиняет боль. Нередко к кольпиту присоединяется воспаление мочевого пузыря, сопровождающееся частыми болезненными позывами к мочеиспусканию.

У мужчин при трихомониазе воспаляется слизистая оболочка мочеиспускательного канала, возникает так называемый трихомонадный уретрит. При этом нередко поражаются и придаточные половые железы. Инфекция начинается остро, характеризуется часто обильными, иногда пенстыми выделениями из мочеиспускательного канала, края которого воспаляются и отекают. Однако в большинстве случаев трихомонадный уретрит у мужчин протекает вяло, без перечисленных симптомов.

ВНИМАНИЕ!

Проявления трихомониаза как у мужчин, так и у женщин могут исчезнуть сами по себе, но это не значит, что наступило самоизлечение.

Если не обращаться к врачу за помощью, то трихомониаз, периодически обостряясь, может продолжаться годами и даже десятилетиями. Носители трихомонад, не подозревая о болезни, могут заразить здоровых людей.

Иногда трихомониаз напоминает другие болезни, передаваемые половым путем, - гонорею, хламидиоз, уреаплазмоз ... Определить заболевание в каждом конкретном случае можно только лабораторным путем.



Врожденной устойчивости к инфекции нет.

Трихомониаз опасен последствиями

Инфекция излечима при условии, если своевременно поставлен диагноз и правильно проводится лечение, в противном случае она опасна осложнениями.

Тяжелыми последствиями, в том числе бесплодием, трихомониаз грозит и мужчине, и женщине. Дело в том, что из мочеиспускательного канала трихомонады проникают в придатки яичек и предстательную железу, вызывая в тканях этих органов воспалительные процессы и нарушая тем самым их функции.

ЗНАЙТЕ! От трихомониаза не существует домашних и народных средств. Лечитесь только в специализированном медицинском учреждении!

Для предотвращения повторного заражения ЛЕЧЕНИЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ОБОИМ ПОЛОВЫМ ПАРТНЕРАМ, даже в том случае, если у мужчины трихомонады не обнаружены, а у женщины они есть, или, наоборот.

Как защититься?

УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ ИППП, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ТРИХОМОНИАЗА, ВАМ ПОМОГУТ:

- *верность в браке или одному сексуальному партнеру;*
- *использование средств индивидуальной защиты, в первую очередь, презерватива;*
- *забота о своем здоровье и здоровье своего партнера (осмотры у гинеколога, уролога, дерматовенеролога).*



ИППП

Если Вам не удалось избежать случайной половой связи, обязательно подстрахуйтесь: **не позже 2-х часов после сомнительного контакта** обратитесь в пункт индивидуальной профилактики, где Вам бесплатно окажут анонимную квалифицированную медицинскую помощь.

тел. в г. Бресте

+375 162 53-05-21

+375 29 205-34-30

(круглосуточно)



Учреждение здравоохранения
"Брестский областной
кожно-венерологический
диспансер"

Брест, 2025

Трихомониаз